Devoir surveillé n°02 – mathématiques
Correction**Exercice 1 (10 points)**

1. (a) Étant donné que l'on tire au hasard un cube parmi 100, la loi est équirépartie et on obtient l'arbre suivant :

- (b) $\mathbb{P}_R(E)$ est la probabilité que soit tiré un cube marqué d'une étoile sachant qu'il est rouge. Cette probabilité vaut 0,3 (visible sur l'arbre).
- (c) On nous demande de calculer $\mathbb{P}(L)$. On utilise la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(L) &= \mathbb{P}(B \cap L) + \mathbb{P}(R \cap L) \\
 &= \mathbb{P}(B) \times \mathbb{P}_B(L) + \mathbb{P}(R) \times \mathbb{P}_R(L) \\
 &= 0,6 \times 0,2 + 0,4 \times 0,5 \\
 &= 0,12 + 0,20 \\
 &= 0,32
 \end{aligned}$$

La probabilité que soit tiré un cube marqué d'un losange est donc 0,32.

- (d) On nous demande de calculer $\mathbb{P}_L(B)$. On utilise la définition :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}_L(B) &= \frac{\mathbb{P}(B \cap L)}{\mathbb{P}(L)} \\
 &= \frac{0,12}{0,32} \\
 &= 0,6 \times 0,2 + 0,4 \times 0,5 \\
 &= 0,375
 \end{aligned}$$

La probabilité que soit tiré un cube bleu sachant qu'il est marqué d'un losange est donc 0,375.

2. (a) Cette fois-ci, $\mathbb{P}_R(L) = \frac{x}{100}$. Par suite,

$$\mathbb{P}(L) = \mathbb{P}(B \cap L) + \mathbb{P}(R \cap L) = 0,12 + \mathbb{P}(R) \times \mathbb{P}_R(L) = 0,12 + 0,4 \times \frac{x}{100} = 0,12 + 0,004x.$$

- (b) On veut B et L indépendants. C'est le cas si, par définition, $\mathbb{P}_B(L) = \mathbb{P}(L)$, autrement dit si $0,2 = 0,12 + 0,004x$. On résout cette équation, et on trouve $x = 20$. Il faut donc que 20% des boules rouges soient marquées d'un losange.

On peut aussi considérer l'équation provenant de la propriété qui caractérise l'indépendance (mais ici c'est plus long et compliqué) :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B \cap L) = \mathbb{P}(B) \times \mathbb{P}(L) &\Leftrightarrow 0,12 = 0,6 \times (0,12 + 0,004x) \\ &\Leftrightarrow 0,12 = 0,072 + 0,0024x \\ &\Leftrightarrow 0,048 = 0,0024x \\ &\Leftrightarrow x = 20 \end{aligned}$$

Exercice 2

- On a $f'(x) = 3x^2 - 2x - 1$.
- Il faut tout d'abord déterminer le signe de $f'(x)$, qui est une fonction polynomiale de degré 2. On détermine alors ses racines en calculant le discriminant :

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 3 \times (-1) = 4 + 12 = 16 = 4^2 > 0.$$

Il y a donc deux racines : $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{2 - 4}{2 \times 3} = \frac{-1}{3}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{2 + 4}{6} = 1$

Comme $a = 3 > 0$, on a le signe de f' puis les variations de f comme suit :

x	-1	$-\frac{1}{3}$	1	2	
Signe de $f'(x)$	+	0	-	0	+
variations de f	-2	$\nearrow$ $-\frac{22}{27}$ $\searrow$	-2	$\nearrow$ 1	

- f étant une fonction polynomiale, elle est continue sur $[1; 2]$. De plus, d'après le tableau de variations, f est strictement croissante sur $[1; 2]$. Enfin, $f(1) = -2$ et $f(2) = 1$. Donc $f(1) \leq 0 \leq f(2)$.
Par conséquent, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une unique solution α de l'équation $f(x) = 0$ sur $[1; 2]$.
- Le tableau de variations nous permet d'affirmer que pour tout x de l'intervalle $[-1; 1]$, $f(x)$ est strictement inférieure à 0, donc l'équation $f(x) = 0$ n'a pas de solution sur $[-1; 1]$. Comme α est l'unique solution de $f(x) = 0$ sur $[1; 2]$, on en déduit donc que α est l'unique solution de l'équation $f(x) = 0$ sur I .
- La calculatrice nous permet de donner $\alpha \simeq 1,839$ à 10^{-3} près.

Exercice 3 Sur $] -\infty; 2[$ et $] 2; +\infty[$ respectivement, l'expression de g est obtenue par opérations sur des fonctions usuelles continues, donc g est continue sur ces intervalles. Il suffit alors de vérifier la continuité de g en 2. Soit donc, pour $x = 2$:

- $\frac{1}{x} + \frac{3x}{2} = \frac{1}{2} + \frac{3 \times 2}{2} = \frac{7}{2} = 3,5.$
- $x^3 - 2x - 0,5 = 2^3 - 2 \times 2 - 0,5 = 8 - 4 - 0,5 = 3,5.$

Comme on obtient les mêmes valeurs, on en déduit que g est continue en 2, puis sur $\mathbb{R}$.